

## Conheça os benefícios:

### Vacina da COVID-19



Ajuda a manter você e sua família saudáveis



Segura



Grátis

### Há 3 tipos de vacinas da COVID-19 nos EUA:

- Johnson and Johnson
- Moderna
- Pfizer

Converse com o seu médico ou enfermeira para saber as vacinas disponíveis para você e sua família!



## Saiba os riscos:

### Comum

Reações temporárias amenas podem ocorrer 1 a 2 dias após **todas as 3 vacinas**.



Dor no braço



Dor de cabeça



Sensação de cansaço



Dores no corpo



Febre

### Muito raro

Reações alérgicas graves podem ocorrer 1 a 2 horas para **todas as 3 vacinas**.



Dificuldade para respirar, inchaço no rosto ou garganta



Batimentos cardíacos rápidos



Erupção na pele



Tontura, fraqueza

### Muito raro

Trombose pode ocorrer 1 a 2 semanas após a **vacina da Johnson & Johnson**.



**Trombose** no cérebro, abdômen e pernas com risco de sangramento.

Mulheres com menos de 50 anos de idade correm maior risco.

**Procure assistência médica** imediatamente se sentir algum dos seguintes sintomas:



Falta de ar ou dor no peito



Dor de cabeça ou dor abdominal graves



Inchaço nas pernas



Visão embaçada



Acontecer contusões com facilidade ou pequenas manchas de sangue subcutâneas (não apenas onde a vacina foi aplicada)