

Conozca los beneficios:

La vacuna contra el COVID-19



Ayuda a que usted y su familia se mantengan sanos



Es segura



Es gratis

Hay 3 tipos de vacunas contra el COVID-19 en los EE. UU.:

- Johnson & Johnson
- Moderna
- Pfizer

¡Consulte al doctor o a la enfermera sobre las vacunas disponibles para usted y su familia!



Conozca los riesgos:

Común

Las reacciones leves y pasajeras pueden ocurrir 1-2 días después de cualquiera de las 3 vacunas:



dolor en el brazo



dolor de cabeza



cansancio



dolor de cuerpo



fiebre

Muy poco común

Reacciones alérgicas graves pueden ocurrir 1-2 horas después de cualquiera de las 3 vacunas:



dificultad para respirar, cara o garganta hinchadas



latidos del corazón acelerados



sarpullido



mareos, debilidad

Muy poco común

Los coágulos de sangre pueden aparecer de 1 a 2 semanas después de la vacuna de **Johnson & Johnson**.



Coágulos de sangre en el cerebro, abdomen y piernas con riesgo de hemorragia. Las mujeres menores de 50 años corren un mayor riesgo.

Busque atención médica de inmediato si tiene:



dificultad para respirar o dolor de pecho



fuertes dolores de cabeza o dolor abdominal



hinchazón de la pierna



visión borrosa



desarrolla moretones con facilidad o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel (no sólo donde se aplicó la vacuna).