

50+?

预防带状疱疹！



什么是带状疱疹？

- 带状疱疹是一种能引起长期神经疼痛的疼痛性皮肤病。
- 美国三分之一的人会患上带状疱疹。患病风险随着年龄的增长而增加。
- 严重的并发症包括持续数月的疼痛。

注射2剂新的带状疱疹疫苗 (Shingrix®)

我在2018年之前，接种过带状疱疹疫苗。

我还需要接种新疫苗吗？

是的！疫苗对预防带状疱疹有90%以上的效果。

我已经患过带状疱疹，还需要注射这种疫苗吗？

是的！这种疫苗可以防止带状疱疹复发。

我需要注射几针新疫苗？

两针。第一次注射后2-6个月，再注射第二针。

我的健康计划是否涵盖Shingrix®？

大多数私人保险、医疗保险D部分和Medi-Cal均承保Shingrix®。您可以打电话询问保险计划负责机构，确认保险范围或费用。

注射后，可能会有什么感觉？

通常情况下，注射疫苗时您会感到手臂疼痛或肿胀。有些人会感到疲劳、头痛、胃痛，或持续数天的恶心感。

有关详细信息，请访问[CDC.gov/疫苗/带状疱疹页面](https://www.cdc.gov/vaccines/diseases/zoster/shingrix)



真实案例：Jim

我们去过多多个急诊室，
拜访过多个眼科专家.....
在长达四年的时间里。

—Jim，带状疱疹患者，
已治愈。访问

[ShotByShot.org](https://www.shotbyshot.org)，
查看完整的带状疱疹患
者案例。



**现在，就请让医生
或药剂师为您注射
新的带状疱疹疫苗
吧！**

