

Lista de Verificación antes de la Vacunación contra Monkeypox con JYNNEOS



Nombre del Paciente: _____ Fecha de Nacimiento: ___/___/___

Las siguientes preguntas nos ayudarán a determinar si existe alguna razón por la cual usted no debe recibir la vacuna contra *monkeypox* (viruela del mono) JYNNEOS. Si responde “Sí” a alguna de las siguientes preguntas, esto no significa que usted no debería recibir la vacuna, pero podríamos requerir hacerle preguntas adicionales. Si alguna de las preguntas no está clara, por favor pídale a su proveedor médico que le explique con más detalle.

1. ¿Está enfermo hoy?
 Sí No No sé

2. ¿Ha sido diagnosticado con *monkeypox* (viruela del mono) recientemente?
 Sí No No sé

3. Si contestó sí a la pregunta 2, ¿en qué fecha lo diagnosticaron?
___/___/___

4. ¿Alguna vez ha recibido una dosis de una vacuna contra *monkeypox* o una vacuna contra la viruela?
 Sí No No sé

5. Si contestó sí a la pregunta 4,
 - a. ¿Qué producto? JYNNEOS ACAM2000

 - b. Fecha de vacunación
___/___/___

6. ¿Ha tenido alguna reacción alérgica severa a una dosis de JYNNEOS previamente?
 Sí No No sé

7. ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica severa (por ejemplo, anafilaxia) a algún medicamento, vacuna o alimento?

Lista de Verificación antes de la Vacunación contra Monkeypox con JYNNEOS

8. Si contestó sí a la pregunta 7, ¿qué medicamento, vacuna o alimento le causó esa reacción?

9. ¿Tiene un historial de cicatrices queloides?

Sí No No sé

10. ¿Está embarazada o piensa que podría estar embarazada?

Sí No No sé

11. ¿Está amamantando?

Sí No No sé

12. ¿Está inmunodeprimido?

Sí No No sé

Forma completada por: _____

Fecha: __/__/__

Forma revisada por: _____

Fecha: __/__/__

Lista de Verificación antes de la Vacunación contra Monkeypox con JYNNEOS



Información para Profesionales de la Salud acerca de la Lista de Verificación

¿Está enfermo hoy?

No existe evidencia de que la enfermedad aguda reduzca la eficacia de esta vacuna o aumente los eventos adversos por la vacuna. Las personas que presentan una enfermedad moderada o grave generalmente no deben ser vacunados hasta que sus síntomas hayan mejorado. Las enfermedades leves con o sin fiebre no son una contraindicación para la vacunación con JYNNEOS. No evite la vacunación solamente porque una persona esté tomando antibióticos.

¿Ha sido diagnosticado con *monkeypox* (viruela del mono) recientemente?

En estos momentos, no se recomienda la vacunación a personas que han tenido monkeypox durante este brote.

¿Ha tenido alguna reacción alérgica severa a una dosis de JYNNEOS previamente?

Las personas que hayan tenido una reacción alérgica grave a una dosis previa de JYNNEOS no deben recibir dosis adicionales de esta vacuna.

¿Alguna vez ha recibido una dosis de una vacuna contra *monkeypox* o una vacuna contra la viruela?

Intervalo recomendado: La segunda dosis de la vacuna JYNNEOS debe ser administrada 28 días después de la primera dosis. La segunda dosis puede ser administrada hasta 7 días después del intervalo mínimo de 28 días (hasta 35 días después de la primera dosis).

Si la segunda dosis no se administra en el intervalo recomendado, debe administrarse lo antes posible según las buenas prácticas generales de ACIP. No es necesario reiniciar o agregar dosis a la serie de vacunación si hay un intervalo mayor entre las dosis.

¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica severa a algún medicamento, vacuna o alimento?

Las personas que hayan tenido una reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a algún componente de la vacuna (gentamicina, ciprofloxacino, proteínas del huevo) no deben recibir esta vacuna. Por favor revise la [guía de contraindicaciones y precauciones de CDC](#). Después de haber explicado los riesgos y beneficios a la persona, se le podrá vacunar con un periodo de observación de 30 minutos. De manera alternativa, al tomarse en cuenta el riesgo de contagio con *monkeypox* si la vacuna se prorroga, se puede consultar a un alergólogo antes de que la vacuna sea administrada.

¿Tiene un historial de cicatrices queloides?

A las personas que tengan un historial de cicatrices queloides se les debe ofrecer la administración subcutánea.

Lista de Verificación antes de la Vacunación contra Monkeypox con JYNNEOS

¿Está embarazada o piensa que podría estar embarazada?

El embarazo no es una contraindicación para la vacunación con JYNNEOS para aquellas personas que hayan sido expuestas a *monkeypox* (viruela del mono). Los datos disponibles en humanos acerca de la administración de JYNNEOS a mujeres embarazadas no son suficientes para informar acerca de los riesgos asociados con la vacunación durante el embarazo. Sin embargo, en modelos animales, incluyendo en ratas y conejos, no se ha encontrado evidencia de daño fetal. La infección por *monkeypox* durante el embarazo está asociada con algunas complicaciones, incluyendo infección congénita grave, pérdida del embarazo y morbilidad y mortalidad materna. Los proveedores de salud deberán analizar los riesgos y beneficios con el paciente por medio de la toma de decisiones compartida.

¿Está amamantando?

La lactancia no es una contraindicación para la vacunación con JYNNEOS para aquellas personas que hayan sido expuestas a *monkeypox* (viruela del mono). Se desconoce si JYNNEOS se excreta en la leche materna en humanos. Todavía no hay datos disponibles para evaluar los efectos de JYNNEOS en el lactante o en la producción de leche. Sin embargo, ya que la vacuna JYNNEOS no tiene capacidad de replicación, es probable que no represente un riesgo de transmisión a los lactantes. Los proveedores de salud deberán analizar los riesgos y beneficios con el paciente por medio de la toma de decisiones compartida.

¿Está inmunodeprimido?

Es seguro administrar JYNNEOS a las personas inmunodeprimidas. En general estas personas pueden tener menor probabilidad de generar una respuesta inmune efectiva ante una vacuna.